

聯興醫事檢驗所公告

公告編碼：2026-09

日期：115年09月14日

公告事項：

1. 修訂17- α -Hydroxy Progesterone, 17-OHP, 17 α -OH-progesterone 17-氫氧基黃體脂酮參考區間
2. 骨鈣素 osteocalcin 建議檢體類別為Plasma(EDTA、Lithium Heparin)

1. 文件審查 2026.09.16起，修正紙本發出報告17- α -Hydroxy Progesterone參考區間之備註，

參考備註如下：

Females：

Follicular (濾泡期)：0.21-1.45 ng/mL

Luteal (黃體期)：0.61-2.88 ng/mL

Preovulatory peak (排卵前期)：0.55-2.01 ng/mL

Post-Menopausal (停經後)：0.16-0.79 ng/mL

Contraception (避孕期)：0.18-1.47 ng/mL

Pregnancy 1st trimester：0.93-3.82 ng/mL

Pregnancy 2nd trimester：1.23-3.70 ng/mL

Male：0.55-1.99 ng/mL

Children 6-23 months：0.14-2.35 ng/mL

Boys 2-11 years：0.14-1.41 ng/mL，Boys 12-15 years：0.32-2.10 ng/mL

Girls 2-9 years：0.19-1.63 ng/mL，Girls 10-15 years：0.42-2.64 ng/mL

檢驗機構：立人醫事檢驗所(台北)

原備註：Contraception (避孕期)：0.18-1.47；Pregnancy 1st trimester：0.93-3.82；Pregnancy 2nd trimester：1.23-3.70

Male：0.55-1.99；檢驗機構：立人醫事檢驗所(台北)

2. 檢驗項目：骨鈣素 osteocalcin，建議檢體類別為Plasma(EDTA、Lithium Heparin)

檢體採集：Serum 0.5mL 或Plasma(EDTA、Lithium Heparin) 0.5mL都可，

檢體須避免溶血！

委外單位建議：Plasma(EDTA、Lithium Heparin)：因要將血液立即離心，紅血球含有可分解骨鈣素的蛋白酶；Plasma:2-8°C可維持3天，檢體只可冷凍一次

聯興醫事檢驗所

負責人黃柏樺敬上